



ДЕНЬ СЕНАЖА Приволжского округа

www.imol.club
(495) 668-39-28



**Агротехнические приемы повышения
качества и урожайности кормовых культур**
Владимир Жуков

Кошение

Высота кошения - **не менее 10 см** – быстрое отрастание, меньше загрязнений в корме.

Используйте **башмаки увеличенного среза!**

Острота ножей - ровный срез позволяет растению быстрее восстановиться и накопить углеводы в корне



Плющение

Вальцовое плющение ускоряет потерю влаги стеблем, и практически не влияет на скорость сушки листьев. Тем самым выравнивает скорость высыхания частей растения



Пальцевое плющение увеличивает потери листовой части больше чем 5%



Широкое распределение

Используйте системы широкого распределения


Покрывайте не менее 70–80% площади скашивания.




Самоходные косилки могут делать только узкие валки, Расстил невозможен. Валок использует менее половины солнечного света, падающего на поле. Валки дольше дышат и сжигают крахмал и сахар, вызывая потерю от 4% до 6% сухого вещества



Вспушивание и Ворошение



При вспушивании свежескошенная культура равномерно разбрасывается по прокосам.



Ворошение обеспечивает равномерное просыхание скошенной культуры.



Сгребание в центр предпочтительнее сгребанию на край через 2 валка

Прим.: Высокий срез и хорошо распределенная масса позволяют собирать чистую массу

Лучший вид упаковки и хранения



Уборка сенажа в индивидуальную упаковку в рулоны. Высокое качество кормов за счет уменьшения потерь листовой части и прочих потерь.

Проблема не убранных валков



Остатки покровной культуры = низкое качество корма



Отсутствие ухода = прошлогодняя трава в корме



Борьба с сорняками - Осветляющее подкашивание



Люцерна в первый год особенно подвержена влиянию сорняков, поскольку межвидовая конкуренция может препятствовать росту и развитию люцерны и ухудшать устойчивость травостоя

Перезимовка

Вымерзание - частичное или полное отмирание растения

Приемы минимизации ущерба

- Подкормка
- Управление скашиванием
- Удержание снега
- Поддерживание РН почвы
- Дренаж почвы



Перезимовка

Выпревание люцерны -
Полностью или частичное
поражение растения

Развитие гнилостных,
плесневых и патогенных
бактерий



**Важно! Причина потери до 50% растений.
Их место занимают сорняки**

Техника для ухода, осветления и подготовки люцерны к зимовке - Мульчировщики



Благодарим за внимание!



ДЕНЬ СЕНАЖА Приволжского округа

www.imol.club
(495) 668-99-28